

Aula 7 — Como as derivadas afetam a forma de um gráfico

14/10/2026 · Stewart, *Cálculo*, vol. 1, Seções 2.8 e 4.3

Nesta aula revisamos brevemente as derivadas de ordem superior, em especial a segunda derivada e suas interpretações como taxa de variação da inclinação e como aceleração. Em seguida estudamos o que os sinais de f' e de f'' dizem sobre a forma do gráfico de f : onde a função cresce ou decresce (Teste Crescente/Decrescente), como classificar seus números críticos (Teste da Primeira Derivada), onde o gráfico é côncavo para cima ou para baixo (Teste da Concavidade), o que são pontos de inflexão e como a segunda derivada também permite reconhecer máximos e mínimos locais (Teste da Segunda Derivada). Terminamos usando todas essas informações para esboçar gráficos.

2.8 Derivadas de Ordem Superior (revisão)

Se f for uma função derivável, então sua derivada f' também é uma função, de modo que f' pode ter sua própria derivada, denotada por $(f')' = f''$. Essa nova função f'' é chamada *segunda derivada* (ou derivada de ordem dois) de f . Na notação de Leibniz, a segunda derivada de $y = f(x)$ é

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d^2y}{dx^2}.$$

Exemplo 6. Se $f(x) = x^3 - x$, encontre e interprete $f''(x)$.

Solução. No Exemplo 2 da Seção 2.8 encontramos a primeira derivada $f'(x) = 3x^2 - 1$. Assim, a segunda derivada é

$$\begin{aligned} f''(x) &= (f')'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x+h) - f'(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[3(x+h)^2 - 1] - [3x^2 - 1]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3x^2 + 6xh + 3h^2 - 1 - 3x^2 + 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (6x + 3h) = 6x. \end{aligned}$$

Os gráficos de f , f' e f'' estão na Figura 1. Podemos interpretar $f''(x)$ como a inclinação da curva $y = f'(x)$ no ponto $(x, f'(x))$; em outras palavras, é a taxa de variação da inclinação da curva original $y = f(x)$. Observe na figura que $f''(x)$ é negativa quando $y = f'(x)$ tem inclinação negativa e positiva quando $y = f'(x)$ tem inclinação positiva. Assim, os gráficos servem como verificação dos cálculos. ■

Em geral, podemos interpretar a segunda derivada como uma *taxa de variação de uma taxa de variação*. O exemplo mais familiar é a *aceleração*. Se $s = s(t)$ é a função posição de um objeto que se move em uma reta, sua primeira derivada é a velocidade:

$$v(t) = s'(t) = \frac{ds}{dt}.$$

A taxa instantânea de variação da velocidade em relação ao tempo é a *aceleração* $a(t)$ do objeto. Assim, a aceleração é a derivada da velocidade e, portanto, a segunda derivada da posição:

$$a(t) = v'(t) = s''(t) \quad \text{ou, na notação de Leibniz,} \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}.$$




Figura 1: Os gráficos de $f(x) = x^3 - x$, de $f'(x) = 3x^2 - 1$ e de $f''(x) = 6x$.

A *terceira derivada* f''' (ou derivada de terceira ordem) é a derivada da segunda derivada: $f''' = (f'')$. Assim, $f'''(x)$ pode ser interpretada como a inclinação da curva $y = f''(x)$ ou como a taxa de variação de $f''(x)$. Se $y = f(x)$, as notações alternativas são

$$y''' = f'''(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{d^2 y}{dx^2} \right) = \frac{d^3 y}{dx^3}.$$

O processo pode continuar. A quarta derivada f'''' é usualmente denotada por $f^{(4)}$. Em geral, a n -ésima derivada de f é denotada por $f^{(n)}$ e é obtida a partir de f derivando n vezes. Se $y = f(x)$, escrevemos

$$y^{(n)} = f^{(n)}(x) = \frac{d^n y}{dx^n}.$$

Exemplo 7. Se $f(x) = x^3 - x$, encontre $f'''(x)$ e $f^{(4)}(x)$.

Solução. No Exemplo 6 encontramos $f''(x) = 6x$. O gráfico da segunda derivada é a reta $y = 6x$, de inclinação 6. Como $f'''(x)$ é a inclinação de $f''(x)$, temos

$$f'''(x) = 6$$

para todo x . Assim, f''' é uma função constante, cujo gráfico é uma reta horizontal. Portanto, para todo x ,

$$f^{(4)}(x) = 0. \quad \blacksquare$$

A terceira derivada também tem uma interpretação física. Se $s = s(t)$ é a posição de um objeto que se move ao longo de uma reta, então $s''' = (s'')' = a'$ é a derivada da aceleração, chamada *jerk*:

$$j = \frac{da}{dt} = \frac{d^3 s}{dt^3}.$$

O jerk é, portanto, a taxa de variação da aceleração (*jerk* significa solavanco, sacudida): um jerk grande indica uma variação súbita na aceleração, o que causa um movimento abrupto em um veículo.

Na Seção 4.3, a seguir, veremos outra aplicação da segunda derivada: o conhecimento de f'' nos dá informação sobre a forma do gráfico de f .

4.3 Como as Derivadas Afetam a Forma de um Gráfico

Muitas aplicações do cálculo dependem de nossa habilidade para deduzir fatos sobre uma função f a partir de informações sobre suas derivadas. Como $f'(x)$ representa a inclinação da curva $y = f(x)$ no ponto $(x, f(x))$, ela nos diz para que direção a curva segue em cada ponto. Assim, é razoável esperar que informações sobre $f'(x)$ nos forneçam informações sobre $f(x)$.

O que f' diz sobre f ?

Para ver como a derivada de f pode nos dizer onde uma função é crescente ou decrescente, observe a Figura 2. (As funções crescentes e decrescentes foram definidas na Seção 1.1.) Entre A e B e entre C e D , as retas tangentes têm inclinação positiva e, portanto, $f'(x) > 0$. Entre B e C , as retas tangentes têm inclinação negativa e, portanto, $f'(x) < 0$. Assim, parece que f cresce quando $f'(x)$ é positiva e decresce quando $f'(x)$ é negativa. Para demonstrar que isso é sempre válido, vamos usar o Teorema do Valor Médio.




Figura 2: Onde as tangentes têm inclinação positiva, f cresce; onde têm inclinação negativa, f decresce.

Teste Crescente/Decrescente.

- (a) Se $f'(x) > 0$ em um intervalo, então f é crescente nele.
- (b) Se $f'(x) < 0$ em um intervalo, então f é decrescente nele.

Vamos abreviar o nome deste teste para *Teste C/D*.

Demonstração. (a) Sejam x_1 e x_2 dois números quaisquer no intervalo, com $x_1 < x_2$. Pela definição de função crescente, devemos mostrar que $f(x_1) < f(x_2)$.

Como $f'(x) > 0$ por hipótese, f é derivável em $[x_1, x_2]$. Portanto, pelo Teorema do Valor Médio, existe um número c entre x_1 e x_2 tal que

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1). \quad (1)$$

Agora $f'(c) > 0$, por hipótese, e $x_2 - x_1 > 0$, pois $x_1 < x_2$. Assim, o lado direito de (1) é positivo e, portanto,

$$f(x_2) - f(x_1) > 0 \quad \text{ou} \quad f(x_1) < f(x_2).$$

Isso mostra que f é crescente. A parte (b) é demonstrada de maneira semelhante. ■

Exemplo 1. Encontre onde a função $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 5$ é crescente e onde ela é decrescente.

Solução. Temos

$$f'(x) = 12x^3 - 12x^2 - 24x = 12x(x-2)(x+1).$$

Para usar o Teste C/D, devemos saber onde $f'(x) > 0$ e onde $f'(x) < 0$. Isso depende dos sinais dos três fatores de $f'(x)$, isto é, $12x$, $x-2$ e $x+1$. Dividimos a reta real em intervalos cujas extremidades são os números críticos -1 , 0 e 2 e dispomos o trabalho em uma tabela. Um sinal de mais indica que a expressão é positiva, e um sinal de menos, que ela é negativa. A última coluna dá a conclusão baseada no Teste C/D.

Intervalo	$12x$	$x - 2$	$x + 1$	$f'(x)$	f
$x < -1$	—	—	—	—	decrecente em $(-\infty, -1)$
$-1 < x < 0$	—	—	+	+	crescente em $(-1, 0)$
$0 < x < 2$	+	—	+	—	decrecente em $(0, 2)$
$x > 2$	+	+	+	+	crescente em $(2, \infty)$

Por exemplo, $f'(x) < 0$ para $0 < x < 2$, de modo que f é decrescente em $(0, 2)$. (Também seria verdade dizer que f é decrescente no intervalo fechado $[0, 2]$.) O gráfico de f na Figura 3 confirma a informação da tabela. ■




Figura 3: $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 5$: decrescente em $(-\infty, -1)$ e $(0, 2)$, crescente em $(-1, 0)$ e $(2, \infty)$.

Da Seção 4.1, lembre-se de que, se f tem um máximo ou mínimo local em c , então c deve ser um número crítico de f (pelo Teorema de Fermat), mas nem todo número crítico dá origem a um máximo ou mínimo. Precisamos, portanto, de um teste que nos diga se f tem ou não um máximo ou mínimo local em um número crítico.

Na Figura 3 vemos que $f(0) = 5$ é um valor máximo local de f , pois f cresce em $(-1, 0)$ e decresce em $(0, 2)$. Em termos de derivadas, $f'(x) > 0$ para $-1 < x < 0$ e $f'(x) < 0$ para $0 < x < 2$. Em outras palavras, o sinal de $f'(x)$ muda de positivo para negativo em 0. Essa observação é a base do teste a seguir.

Teste da Primeira Derivada. *Suponha que c seja um número crítico de uma função contínua f .*

- (a) *Se o sinal de f' mudar de positivo para negativo em c , então f tem um máximo local em c .*
- (b) *Se o sinal de f' mudar de negativo para positivo em c , então f tem um mínimo local em c .*
- (c) *Se f' não mudar de sinal em c (isto é, se f' for positiva em ambos os lados de c ou negativa em ambos os lados), então f não tem máximo nem mínimo local em c .*

O Teste da Primeira Derivada é uma consequência do Teste C/D. Na parte (a), por exemplo, como o sinal de $f'(x)$ muda de positivo para negativo em c , f é crescente à esquerda de c e decrescente à direita de c . A consequência é que f tem um máximo local em c . É fácil memorizar o teste visualizando diagramas como os da Figura 4.

Exemplo 2. Encontre os valores de máximo e mínimo locais da função f do Exemplo 1.

Solução. Pela tabela da solução do Exemplo 1, o sinal de $f'(x)$ muda de negativo para positivo em -1 ; então $f(-1) = 0$ é um valor mínimo local, pelo Teste da Primeira Derivada. Analogamente,




Figura 4: O Teste da Primeira Derivada: o que acontece com o sinal de f' em um número crítico c .

o sinal de f' muda de negativo para positivo em 2; portanto, $f(2) = -27$ também é um valor mínimo local. Como observado anteriormente, $f(0) = 5$ é um valor máximo local, pois o sinal de $f'(x)$ muda de positivo para negativo em 0. ■

Exemplo 3. Encontre os valores de máximo e mínimo locais da função

$$g(x) = x + 2 \sin x, \quad 0 \leq x \leq 2\pi.$$

Solução. Para achar os números críticos de g , derivamos:

$$g'(x) = 1 + 2 \cos x.$$

Logo, $g'(x) = 0$ quando $\cos x = -\frac{1}{2}$, cujas soluções em $(0, 2\pi)$ são $2\pi/3$ e $4\pi/3$. Como g é derivável em toda parte, os únicos números críticos são $2\pi/3$ e $4\pi/3$, e analisamos g na tabela a seguir. (Os sinais vêm do fato de que $g'(x) > 0$ quando $\cos x > -\frac{1}{2}$; pelo gráfico de $y = \cos x$, isso ocorre exatamente nos intervalos indicados com +.)

Intervalo	$g'(x) = 1 + 2 \cos x$	g
$0 < x < 2\pi/3$	+	crescente em $(0, 2\pi/3)$
$2\pi/3 < x < 4\pi/3$	-	decrecente em $(2\pi/3, 4\pi/3)$
$4\pi/3 < x < 2\pi$	+	crescente em $(4\pi/3, 2\pi)$

Como o sinal de $g'(x)$ muda de positivo para negativo em $2\pi/3$, o Teste da Primeira Derivada nos diz que há um máximo local em $2\pi/3$, e o valor máximo local é

$$g(2\pi/3) = \frac{2\pi}{3} + 2 \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} + 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{2\pi}{3} + \sqrt{3} \approx 3,83.$$

Da mesma forma, o sinal de $g'(x)$ muda de negativo para positivo em $4\pi/3$, de modo que

$$g(4\pi/3) = \frac{4\pi}{3} + 2 \sin \frac{4\pi}{3} = \frac{4\pi}{3} + 2 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} \approx 2,46$$

é um valor mínimo local. O gráfico de g na Figura 5 confirma a conclusão. ■




Figura 5: $g(x) = x + 2 \sin x$ no intervalo $[0, 2\pi]$.

O que f'' diz sobre f ?

A Figura 6 mostra os gráficos de duas funções crescentes em (a, b) . Ambos os gráficos unem o ponto A ao ponto B , mas eles são diferentes, pois se curvam em direções diferentes. Como distinguir esses dois tipos de comportamento? Na figura, as tangentes às curvas foram traçadas em vários pontos. Em (a), a curva fica acima das tangentes e f é chamada *côncava para cima* em (a, b) . Em (b), a curva fica abaixo das tangentes e g é chamada *côncava para baixo* em (a, b) .




Figura 6: Duas funções crescentes em (a, b) , com algumas de suas tangentes.

Definição. Se o gráfico de f estiver acima de todas as suas tangentes no intervalo I , então f é chamada **côncava para cima** em I . Se o gráfico de f estiver abaixo de todas as suas tangentes em I , então f é chamada **côncava para baixo** em I .

A Figura 7 mostra o gráfico de uma função que é côncava para cima (abrevia-se CC) nos intervalos (b, c) , (d, e) e (e, p) , e côncava para baixo (CB) nos intervalos (a, b) , (c, d) e (p, q) .

Vejamos como a segunda derivada ajuda a determinar os intervalos de concavidade. Olhando para a Figura 6(a), vemos que, indo da esquerda para a direita, a inclinação da tangente cresce. Isso significa que a derivada f' é uma função crescente e, conseqüentemente, sua derivada f'' é positiva. Da mesma forma, na Figura 6(b) a inclinação da tangente decresce da esquerda para a direita; logo, g' decresce e, portanto, g'' é negativa. Esse raciocínio pode ser invertido e sugere que o teorema a seguir é verdadeiro. (Uma demonstração, que usa o Teorema do Valor Médio, está no Apêndice F do livro.)

Teste da Concavidade.

- (a) Se $f''(x) > 0$ para todo x em I , então o gráfico de f é côncavo para cima em I .
- (b) Se $f''(x) < 0$ para todo x em I , então o gráfico de f é côncavo para baixo em I .




Figura 7: Intervalos de concavidade: CC = côncava para cima, CB = côncava para baixo. Os pontos B , C , D e P são pontos de inflexão.

Exemplo 4. A Figura 8 mostra um gráfico da população de abelhas cipriotas criadas em um apiário. Como cresce a taxa populacional? Quando essa taxa é mais alta? Em que intervalos P é côncava para cima ou côncava para baixo?




Figura 8: População de abelhas: P é o número de abelhas (em milhares) e t , o tempo (em semanas).

Solução. Examinando a inclinação da curva quando t cresce, vemos que a taxa de crescimento populacional é inicialmente muito pequena, depois se torna maior até atingir um máximo em cerca de $t = 12$ semanas, e decresce à medida que a população se estabiliza. À medida que a população se aproxima de seu valor máximo, de cerca de 75.000 (chamado *capacidade de suporte*), a taxa de crescimento $P'(t)$ tende a 0. A curva parece ser côncava para cima em $(0, 12)$ e côncava para baixo em $(12, 18)$. ■

No Exemplo 4, a curva populacional passa de côncava para cima a côncava para baixo aproximadamente no ponto $(12, 38.000)$. Esse ponto é chamado *ponto de inflexão* da curva. O significado desse ponto é que a taxa de crescimento populacional atinge ali seu valor máximo. Em geral, um ponto de inflexão é aquele em que uma curva muda o sentido de sua concavidade.

Definição. Um ponto P da curva $y = f(x)$ é chamado **ponto de inflexão** se f é contínua no ponto e a curva muda de côncava para cima para côncava para baixo, ou vice-versa, em P .

Por exemplo, na Figura 7, B , C , D e P são os pontos de inflexão. Observe que, se uma curva tiver uma tangente em um ponto de inflexão, então a curva cruza sua tangente nesse ponto.

Em vista do Teste da Concavidade, há um ponto de inflexão sempre que a segunda derivada mudar de sinal (em um ponto em que f é contínua).

Exemplo 5. Esboce um gráfico possível de uma função f que satisfaça as seguintes condições:

- (i) $f'(x) > 0$ em $(-\infty, 1)$, $f'(x) < 0$ em $(1, \infty)$;
- (ii) $f''(x) > 0$ em $(-\infty, -2)$ e $(2, \infty)$, $f''(x) < 0$ em $(-2, 2)$;
- (iii) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -2$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

Solução. A condição (i) nos diz que f cresce em $(-\infty, 1)$ e decresce em $(1, \infty)$. A condição (ii) diz que f é côncava para cima em $(-\infty, -2)$ e $(2, \infty)$ e côncava para baixo em $(-2, 2)$. Pela condição (iii), o gráfico de f tem duas assíntotas horizontais: $y = -2$ e $y = 0$.

Primeiro, traçamos a assíntota horizontal $y = -2$ como uma linha tracejada (veja a Figura 9). Então fazemos o gráfico de f tendendo a essa assíntota no extremo esquerdo, crescente até seu máximo no ponto $x = 1$ e decrescente em direção ao eixo x no extremo direito. Também garantimos que o gráfico tenha pontos de inflexão em $x = -2$ e $x = 2$: a curva é encurvada para cima para $x < -2$ e $x > 2$, e para baixo quando x está entre -2 e 2 . ■




Figura 9: Um gráfico possível para o Exemplo 5; os pontos marcados são os pontos de inflexão.

Outra aplicação da segunda derivada é o teste a seguir para valores máximo e mínimo locais. Ele é uma consequência do Teste da Concavidade.

Teste da Segunda Derivada. Suponha que f'' seja contínua na proximidade de c .

(a) Se $f'(c) = 0$ e $f''(c) > 0$, então f tem um mínimo local em c .

(b) Se $f'(c) = 0$ e $f''(c) < 0$, então f tem um máximo local em c .

Por exemplo, a parte (a) é verdadeira porque $f''(x) > 0$ perto de c e, portanto, f é côncava para cima perto de c . Isso significa que o gráfico de f fica *acima* de sua tangente horizontal em c , de modo que f tem um mínimo local em c (veja a Figura 10).

Exemplo 6. Examine a curva $y = x^4 - 4x^3$ em relação à concavidade, aos pontos de inflexão e a mínimos e máximos locais. Use essa informação para esboçar a curva.

Solução. Se $f(x) = x^4 - 4x^3$, então

$$f'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x - 3), \quad f''(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x - 2).$$

Para encontrar os números críticos, fazemos $f'(x) = 0$ e obtemos $x = 0$ e $x = 3$. Para usar o Teste da Segunda Derivada, calculamos f'' nesses números críticos:

$$f''(0) = 0, \quad f''(3) = 36 > 0.$$




Figura 10: $f''(c) > 0$: f é côncava para cima perto de c e $f(x) \geq f(c)$.

Como $f'(3) = 0$ e $f''(3) > 0$, $f(3) = -27$ é um mínimo local. Como $f''(0) = 0$, o Teste da Segunda Derivada não fornece informação sobre o número crítico 0. Mas, como $f'(x) < 0$ para $x < 0$ e também para $0 < x < 3$, o Teste da Primeira Derivada nos diz que f não tem máximo nem mínimo local em 0. [De fato, a expressão de $f'(x)$ mostra que f decresce à esquerda de 3 e cresce à direita de 3.]

Como $f''(x) = 0$ quando $x = 0$ ou $x = 2$, dividimos a reta real em intervalos com esses números como extremidades e completamos a tabela:

Intervalo	$f''(x) = 12x(x - 2)$	Concavidade
$(-\infty, 0)$	+	para cima
$(0, 2)$	-	para baixo
$(2, \infty)$	+	para cima

O ponto $(0, 0)$ é um ponto de inflexão, pois a curva muda ali de côncava para cima para côncava para baixo. Também $(2, -16)$ é um ponto de inflexão, pois ali a curva muda de côncava para baixo para côncava para cima.

Usando o mínimo local, os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão, esboçamos a curva na Figura 11. ■




Figura 11: $y = x^4 - 4x^3$: pontos de inflexão em $(0, 0)$ e $(2, -16)$ e mínimo local em $(3, -27)$.

Observação. O Teste da Segunda Derivada é *inconclusivo* quando $f''(c) = 0$. Em outras palavras, nesse ponto pode haver um máximo, um mínimo ou nenhum dos dois (como no Exemplo 6). O teste também falha quando $f''(c)$ não existe. Nesses casos, o Teste da Primeira Derivada deve ser usado. De fato, mesmo quando ambos os testes se aplicam, o Teste da Primeira Derivada é muitas vezes mais fácil de usar.

Exemplo 7. Esboce o gráfico da função $f(x) = x^{2/3}(6-x)^{1/3}$.

Solução. Pelas regras de derivação, as duas primeiras derivadas são

$$f'(x) = \frac{4-x}{x^{1/3}(6-x)^{2/3}}, \quad f''(x) = \frac{-8}{x^{4/3}(6-x)^{5/3}}.$$

Para conferir f' , use a Regra do Produto:

$$f'(x) = \frac{2}{3}x^{-1/3}(6-x)^{1/3} - \frac{1}{3}x^{2/3}(6-x)^{-2/3} = \frac{2(6-x) - x}{3x^{1/3}(6-x)^{2/3}} = \frac{4-x}{x^{1/3}(6-x)^{2/3}};$$

derivando f' do mesmo modo (e pondo $x^{4/3}(6-x)^{5/3}$ em evidência no denominador) obtém-se f'' .

Como $f'(x) = 0$ quando $x = 4$ e $f'(x)$ não existe quando $x = 0$ ou $x = 6$, os números críticos são 0, 4 e 6.

Intervalo	$4-x$	$x^{1/3}$	$(6-x)^{2/3}$	$f'(x)$	f
$x < 0$	+	-	+	-	decrecente em $(-\infty, 0)$
$0 < x < 4$	+	+	+	+	crescente em $(0, 4)$
$4 < x < 6$	-	+	+	-	decrecente em $(4, 6)$
$x > 6$	-	+	+	-	decrecente em $(6, \infty)$

Para encontrar os valores extremos locais, usamos o Teste da Primeira Derivada. Como o sinal de f' muda de negativo para positivo em 0, $f(0) = 0$ é um mínimo local. Como o sinal de f' muda de positivo para negativo em 4, $f(4) = 2^{5/3}$ é um máximo local. O sinal de f' não muda em 6; logo, não há nem mínimo nem máximo ali. (O Teste da Segunda Derivada poderia ser usado em 4, mas não em 0 ou 6, pois f'' não existe nesses pontos.)

Examinando a expressão de $f''(x)$ e observando que $x^{4/3} \geq 0$ para todo x , temos $f''(x) < 0$ para $x < 0$ e para $0 < x < 6$, e $f''(x) > 0$ para $x > 6$. Logo, f é côncava para baixo em $(-\infty, 0)$ e em $(0, 6)$ e côncava para cima em $(6, \infty)$, e o único ponto de inflexão é $(6, 0)$. O gráfico está esboçado na Figura 12. Observe que a curva tem tangentes verticais em $(0, 0)$ e $(6, 0)$, pois $|f'(x)| \rightarrow \infty$ quando $x \rightarrow 0$ e quando $x \rightarrow 6$. ■




Figura 12: $f(x) = x^{2/3}(6-x)^{1/3}$: tangentes verticais em $(0,0)$ e $(6,0)$; ponto de inflexão em $(6,0)$.

Observação. Ao reproduzir o gráfico da Figura 12 com uma calculadora gráfica ou um computador, alguns programas fornecem o gráfico completo, enquanto outros produzem apenas a parte à direita do eixo y , ou somente a parte entre $x = 0$ e $x = 6$, porque não calculam potências fracionárias de números negativos. Uma expressão equivalente que fornece o gráfico correto é

$$y = (x^2)^{1/3} \cdot \frac{6-x}{|6-x|} |6-x|^{1/3}.$$

Exemplo 8. Use a primeira e a segunda derivadas de $f(x) = e^{1/x}$, junto com as assíntotas, para esboçar seu gráfico.

Solução. O domínio de f é $\{x \mid x \neq 0\}$; portanto, verificamos a existência de assíntotas verticais calculando os limites laterais quando $x \rightarrow 0$. Quando $x \rightarrow 0^+$, sabemos que $t = 1/x \rightarrow \infty$, logo

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{1/x} = \lim_{t \rightarrow \infty} e^t = \infty,$$

e isso mostra que $x = 0$ é uma assíntota vertical. Quando $x \rightarrow 0^-$, temos $t = 1/x \rightarrow -\infty$, de modo que

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{1/x} = \lim_{t \rightarrow -\infty} e^t = 0.$$

Quando $x \rightarrow \pm\infty$, temos $1/x \rightarrow 0$; logo,

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} e^{1/x} = e^0 = 1,$$

o que mostra que $y = 1$ é uma assíntota horizontal.

Agora vamos calcular a derivada. A Regra da Cadeia dá

$$f'(x) = -\frac{e^{1/x}}{x^2}.$$

Como $e^{1/x} > 0$ e $x^2 > 0$ para todo $x \neq 0$, temos $f'(x) < 0$ para todo $x \neq 0$. Assim, f é decrescente em $(-\infty, 0)$ e em $(0, \infty)$. Não há número crítico; logo, a função não tem máximo nem mínimo locais. A segunda derivada é

$$f''(x) = -\frac{x^2 e^{1/x} (-1/x^2) - e^{1/x} (2x)}{x^4} = \frac{e^{1/x} (2x + 1)}{x^4}.$$

Como $e^{1/x} > 0$ e $x^4 > 0$, temos $f''(x) > 0$ quando $x > -\frac{1}{2}$ ($x \neq 0$) e $f''(x) < 0$ quando $x < -\frac{1}{2}$. Portanto, a curva é côncava para baixo em $(-\infty, -\frac{1}{2})$ e côncava para cima em $(-\frac{1}{2}, 0)$ e em $(0, \infty)$. O ponto de inflexão é $(-\frac{1}{2}, e^{-2})$.

Para esboçar o gráfico de f , primeiro desenhamos a assíntota horizontal $y = 1$ (tracejada), junto com as partes da curva próximas das assíntotas, em um esboço preliminar [Figura 13(a)]. Essas partes refletem a informação sobre os limites e o fato de que f é decrescente tanto em $(-\infty, 0)$ quanto em $(0, \infty)$. Observe que indicamos que $f(x) \rightarrow 0$ quando $x \rightarrow 0^-$, mesmo que $f(0)$ não exista. Na Figura 13(b) terminamos o esboço incorporando a informação sobre a concavidade e o ponto de inflexão. Na Figura 13(c) conferimos o trabalho com um gráfico traçado por computador. ■




Figura 13: O gráfico de $f(x) = e^{1/x}$.